

BULLETIN  
DE LA  
SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

---

**Séance du 10 juillet 1918.**

Présidence de M. J. DE JOANNIS, ancien Président.

*Nouvelles de nos collègues aux Armées.* — Nous avons reçu de bonnes nouvelles du lieutenant R. BOURGERIE; blessé tout dernièrement, notre collègue est en bonne voie de guérison, à Montauban.

*Nécrologie.* — M. J. LAURENT, professeur à Reims, vient de mourir à Paris; il était membre de la Société depuis 1899.

*Exonération.* — M. le D<sup>r</sup> ZARIQUEY, récemment admis, s'est fait inscrire comme membre à vie.

*Admission.* — M. Eugène CORSY, 22, rue de la Mutualité, Montreuil-sous-Bois (Seine). — *Entomologie générale.* — (Réadmission.)

---

**Communications.**

**Description d'un *Megalodacne* nouveau de Madagascar**

[COL. EROTYLIDAE]

par L. BEDEL.

*Megalodacne dominula*, n. sp. — *Oblonga, retrorsum attenuata et fere cuneiformis, atra, antice sericeo-subnitida, elytris nitidioribus, punctato-striatis, rubro-bifasciatis. Caput subtiliter punctulatum. Pronotum subtrapezoidale, lateribus obliquis, disco subnitido, subtilissime punctulato. Elytra parum elongata, a basi ad apicem attenuata; fascia basali lata, ad suturam in intervallo secundo extensa, punctum ovale nigrum includente ac maculam humeralem itidem nigrum semi-cingente.* — Long. 14-15 mm.

Madagascar (Nord) : Montagne des Français près Diego-Suarez (coll. L. BEDEL et coll. A. SICARD).

*Bull. Soc. ent. Fr.* 1918]. — N° 13.

Très voisin de *M. sponsa* Guér., jusqu'ici le seul *Megalodacne* (s. str.) connu de Madagascar. En diffère par son arrière-corps subcunéiforme, son pronotum en trapèze, moins mat, distinctement pointillé sur le disque, et par la première fascie rouge des élytres empiétant sur le 2<sup>e</sup> interstrie.

Le tableau suivant permettra de distinguer facilement ces deux espèces :

- Insecte allongé, nullement cunéiforme. Tête mate, non ponctuée. Pronotum carré, à côtés presque parallèles, entièrement mat et imponctué. Élytres à fascies rouges relativement étroites; la première, coupée droit au côté interne, n'empiétant aucunement sur le 2<sup>e</sup> interstrie et encerclant une macule noire plus ou moins allongée, rapprochée de la base; deuxième fascie étroite et profondément découpée (1)..... *sponsa* Guér. (2)
- Insecte peu allongé, atténué en arrière et subcunéiforme. Tête finement ponctuée. Pronotum trapézoïdal, assez terne à reflets soyeux, très finement pointillé. Élytres à fascies rouges relativement larges; la première empiétant sur le 2<sup>e</sup> interstrie, encerclant une macule noire ovale et largement isolée; deuxième fascie moins profondément découpée..... *dominula* Bed.

### Genre nouveau d'*Elateridae* [CÔL.] de l'Afrique équatoriale

par E. FLEUTIAUX.

**Melanoxus**, nov. gen. — Tête petite, bord antérieur élevé au-dessus du labre au milieu; épistome petit, semicirculaire, limité latéralement par une carène; fossettes antennaires indépendantes; labre petit, arrondi. Antennes dentées à partir du 3<sup>e</sup> article; 2<sup>e</sup> article petit. Pronotum grand, avec une épine obtuse au milieu de la base; angles postérieurs longs, aigus, partagés en deux parties égales par une forte carène. Écusson rectangulaire, incliné. Élytres courts, plus étroits que le pronotum, atténués en arrière, entiers au sommet. Sutures prosternales fines. Saillie prosternale longue, étroite, effilée.

(1) D'après LACORDAIRE, chez le *type* de GUÉRIN cette fascie était même morcelée.

(2) Chez cette espèce la taille varie de 14 à 20 mm.